






**PERUTNINARSKI
DNEVI
PERADARSKI –
ŽIVINARSKI DANI
LJUBLJANA
1985**

ŽIVA MASA KOKICA NA 18 NEDELJA KAO FAKTOR ZA PROIZVODNA SVOJSTVA
U PRVOJ FAZI NOSIVOSTI

K. FILEV¹, J. ŠOKAROVSKI²

U cilju utvrđivanja efekta startne žive mase kokica na njihova proizvodna svojstva u prvoj fazi nosivosti izvedeni su eksperimenti sa ukupno 5.060 kokica podeljeni u tri grupe. U prvoj grupi su bile smeštene one sa živom masom od 1.300 do 1.500 g, u drugoj od 1.521 do 1.720 g i u trećoj od 1.721 do 1.920 g.

Istraživanja su pokazala:

- da je ukupan broj snešenih jaja po grlu pod uticajem startne žive mase i da je isti bolji kod nosilja sa većom živom masom (I. gr. - 110,3; II. gr. - 113,69 i III. gr. - 116,70);
- da živa masa ima uticaja i na krupnoću proizvedenih jaja, jer su nosilje sa većom živom masom dale krupnija jaja. (I. gr. - 52,2; II. gr. - 53,20 i III. gr. - 55,61 g) i
- da je konverzija hrane bila pod uticajem početne žive mase, jer su kokice sa većom živom masom trošile manje hrane za gram proizvedene jajčane mase (3,39; 3,15 in 3,16 g).

Gledano u celini iz postignutih rezultata može se konstatovati, da su kokice sa početnom živom masom od 1.721 do 1.920 g dale najbolje proizvodne rezultate.

¹dr., doc., RO Zemljodjelski fakultet, OOZT Institut za stočarstvo, 91000 Skopje
²dr., red.prof., isto tamo

